

Vaccinatie tegen het Corona virus.

U krijgt de komende weken of maanden (via de huisarts of de overheid/GGD) een uitnodiging voor het Corona-vaccin.

Dit is een injectie in de spier. Dit kan bij gebruik van bloedverdunners veilig, zeker als op het moment van het vaccineren de INR onder de 3.5 is.

Wat vragen wij van u:

- Wanneer de INR-meting de laatste 3 maanden voor de vaccinatie stabiel was, INR lager dan 3.5 kunt u zich laten vaccineren.
- Was de INR-meting voor de vaccinatie hoger dan 3.5, neemt u dan contact op met de trombosedienst
- Krijgt u een uitnodiging voor het Corona-vaccin. Geef de datum door aan de trombosedienst:
Dit kan op de volgende manieren: **bij voorkeur bij de eerst volgende INR controle.**
Anders per mail: trombosedienst@salt.nl of telefoonnummer: 088-9100100 keuze 2.
- Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven.
- Een week na de vaccinatie zullen wij opnieuw de INR bepalen.

Met hartelijke groet,

Mevr. Anita Nanning, Coördinator

Mevr. Drs N. Telgt, cardioloog en medisch leider

Afdeling Trombosedienst

Eerstelijns diagnostisch centrum

T 088-9 100 100

M trombosedienst@salt.nl

I www.salt.nl